

Informează-te doar din surse verificate și sigure!

C**VID-19**

**UNIUNEA EUROPEANĂ: VACCINAREA:
VACCINAREA SUPLIMENTARĂ ȘI DE RAPEL.**

Acest material apare în cadrul Proiectului "Asigurarea informării corecte și combaterea dezinformării în pandemia COVID-19", implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate în acest material nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.

UNIUNEA EUROPEANĂ: Vaccinarea: Vaccinarea suplimentară și de rapel.

Este posibil ca unele persoane să fi ratat o vaccinare sau să nu fie vaccinați cu numărul recomandat de doze. Acestea se pot recupera.

Toată lumea ar trebui să verifice dacă este vaccinată cu vaccinurile recomandate la nivel național și să consulte un cadru medical în cazul în care este nevoie de vaccinare de recuperare. În acest scop se poate verifica carnetul de vaccinare sau calendarul de vaccinare existent la nașterea persoanei. Pentru unele boli, de exemplu varicelă (vărsat de vânt) și rubeolă, se pot face și analize pentru a vedea dacă persoana este imună.

Dacă o persoană nu știe dacă este vaccinată împotriva unei anumite boli, în mod normal se poate vaccina cu o doză în plus fără ca riscul de reacții adverse grave să crească (1).

Pentru anumite boli se pot organiza **programe de vaccinare suplimentară (recuperare)**. De exemplu, ca urmare a creșterii numărului de cazuri de rujeolă la adolescenți și adulți tineri, într-o serie de țări din UE/SEE există programe de recuperare pentru persoanele care au ratat vaccinarea antirujeolă când erau mai mici sau sunt prea în vârstă ca să fi fost vaccinați când erau copii.

Majoritatea vaccinurilor induc **imunitate pe viață**.

Unele vaccinuri însă induc o **imunitate care scade cu timpul**, numită „imunitate în scădere/ scăderea imunității”. Unele țări recomandă doze de rapel la intervale regulate în adolescență și în perioada adultă pentru a menține imunitatea o perioadă mai lungă, de exemplu împotriva:

- difteriei
- tetanosului
- pertussisului (tuse convulsivă)

Unele țări recomandă rapeluri în special pentru cei care călătoresc sau au un risc mai mare de expunere la boală.

Cadrele medicale pot oferi informații despre dozele de rapel necesare.

Referințe: (1) <https://www.cdc.gov/cdc-info/vaccines-immunizations.html>

Sursa:

<https://vaccination-info.eu/en/vaccination/when-vaccinate/catch-vaccination-and-boosters>

